

IDEXX SNAP® ST – Spartieji Testai antibiotikų likučių nustatymui piene

Simplicity from IDEXX*



Paprasta. Patikima. Be kaitinimo bloko.



Antibiotikai pieno ūkyje naudojami karvėms susirgus, po to tam tikrą laiko antibiotikų likučiai aptinkami piene, todėl tokia žaliava neturi patekti perdirlimui. Tieki augintojui, tieki perdirbėjui svarbu būti tikriems, kad pienas yra kokybiškas.

Dabar antibiotikų likučius piene galima lengvai ir paprastai nustatyti su IDEXX SNAP ST testais.

IDEXX SNAP* ST

- Paprasta – atlikite testą ūkyje, pieno supirkimo punkte ar iš pienovežio.
- Paruošta naudoti – visos reikalingos priemonės rinkinio sudėtyje.
- Greita – rezultatai per 6 min.
- Taupu ir lengva – jokios įrangos, neberekia šildymo bloko, galima vertini vizualiai.
- Saugoma – kambario temperatūroje arba šaldytuve.

Patikima

- Gamyba sertifikuota pagal ISO 9001:2008 kokybės kontrolės standartą.
- Validuotas pagal GOST(Rusija), AOAC(JAV) ir ILVO(ES).

● BETA-LACTAM ● TETRACYCLINE ● BETA-TETRA ● AFLATOXIN M1 ● GENTAMICIN ● SULFAMETHAZINE ● MELAMINE

IDEXX SNAP® ST antibiotikų testai

Vieninteliai greitieji antibiotikų likučių nustatymo testai, kuriems nereikia inkubavimo kaitinimo bloke – greitas ir patikimas rezultatas minimaliomis pastangomis ir sąnaudomis.

- Darbo vieta turi būti švari, 15°C–30°C temperatūros.
- Jei tiriamą ne iškart, mèginiai gali būti saugomi šaldytuve iki trijų dienų 0°C–10°C temperatūroje. Atliekant testą mèginio temperatūra neturi viršyti 10°C.
- Jei testą laikote šaldytuve išimkite jį maždaug 15min. prieš tyrimą.
- Įsitikinkite, kad konjugato granulė yra mègintuvėlio apačioje. Jeigu ne, mègintuvėlį supurtykite, kad granulė nukristų į dugnā.
- Prieš atliekant testą mèginius gerai išmaišykite.



SNAP Beta-Lactam ST SNAP Duo*Beta-Tetra ST

Mèginio paruošimas

1. Pipete pritraukite pieno iki pažymėtos linijos ir supilkite į mègintuvėlį su konjugatu.
2. Švelniai purtykite, kol ištirps konjugato granulė.



Testo atlikimas

3. Mègintuvėlio turinį supilkite į SNAP prietaiso mèginio „Šulinėli“. Supylus mèginį jis pradeda teketi per atsakymo langą link aktyvavimo zonos.
4. Kai aktyvavimo zona pašviesėja iki pusės smarkiai spauskite testą kol pasigirsta „trakšt“.



Rezultatų vertinimas

5. Po 6 min rezultatus įvertinkite vizualiai (arba nuskaitykite skaitytuvu).



Neigiamas: mèginio zona yra tamsesnė ar tokia pat kaip kontrolė.

Teigiamas: mèginio zona yra šviesesnė už kontrolę.

IDEXX SNAP® ST nustatomi antibiotikai ir jų aptikimo ribos

SNAP Beta - Lactam ST (Penicillin G, ampicillin, amoxicillin, cloxacillin, dicloxacillin, nafcillin, oxacillin, cephalonium, cephapirin, ceftiofur, cefazolin, cefoperazone)

Penicilinas G≤ 4ppb

SNAP DUO Beta-Tetra ST (Penicillin G, ampicillin, amoxicillin, cloxacillin, dicloxacillin, nafcillin, oxacillin, cephalonium, cephapirin, ceftiofur, cefazolin, cefoperazone and cefuroxime, tetracycline, oxytetracycline, chlortetracycline, doxycycline)

Penicilinas G ≤ 4ppb
Tetraciklinas ≤ 50ppb
chlortetraciklinas ≤ 100ppb
oksitetraciklinas ≤ 40ppb